

تنظير القصبات

Also available in English: WF85-0712
Bronchoscopy




www.nshealth.ca

تنظير القصبات

ما هو تنظير القصبات؟

- يتيح تنظير القصبات معاينة الرغامى (القصبة الهوائية) والمسالك الهوائية الرئيسية الأخرى.
- يُستخدم أثناء هذا الاجراء منظار القصبات وهو عبارة عن أنبوب مرن مزود بضوء وعدسة عند طرفه.



لماذا أحتاج إلى تنظير القصبات؟

- تشمل أسباب إجراء تنظير القصبات ما يلي:

- < تحديد سبب الأعراض التي تشعر بها
- < أخذ خزعة من أنسجة الرئة، العقد اللمفاوية، الخلايا أو المادة المخاطية
- < إزالة المخاط الذي لا تستطيع التخلص منه بالسعال
- < التحقق من أمر ظهر في التصوير بالأشعة السينية
- < إزالة جسم غريب قمت باستنشاقه
- < تحديد حالات العدوى

ما هي المخاطر؟

- إن احتمال حدوث مضاعفات نتيجة هذا الإجراء هو ضئيل.
- يمكن أن تزداد هذه الاحتمالية بعض الشيء في حال أخذ خزعة (عينة من الأنسجة).
- سيتحدث معك فريق الرعاية الصحية الذي يتابعك عن المخاطر المحتملة قبل الخضوع لهذا الإجراء.

عند حجز موعد للخضوع للتنظير:

• أخبر مساعد/ة الطبيب في حال كنت تأخذ:

< أدوية السكري أو الأنسولين. قد تحتاج إلى اتباع تعليمات معينة بشأن كيفية أخذ هذه الأدوية قبل الخضوع للإجراء.

< مخثرات الدم (أدوية تسييل الدم)، بما في ذلك أسيتيل ساليسيليك أسيد (أسبرين®)، أو أي منتجات تحتوي على أسيتيل ساليسيليك أسيد، وارفارين (كومادين®)، هيبارين (فراجمين®)، ديبغاتران (براداكسا®)، ريفاروكسابان (زاريلتو®)، أبيكسابان (إيكويس®)، إيدوكسابان (ليكسيانا®)

< مضادات تكس الصفائح الدموية (للقاية من السكتات الدماغية والنوبات القلبية) مثل كلوبيدوجريل (بلافيكس®)، براسوغريل (إيفينت®)، أو تيكاجريلور (بريلينتا®)

< الأدوية التي من شأنها أن تضاعف احتمالية حدوث نزيف

< مضادات الالتهاب غير الستيرويدية لتسكين الألم، التهاب المفاصل، النقرس، الصداع النصفي، ألم الاعتلال العصبي أو ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم، مثل إيبوبروفين (موترين®)، أدفيل®)

< المضادات الحيوية التي تؤخذ بعد الخضوع لإجراءات طبية أو لعلاج الأسنان

كيف استعد لهذا الإجراء؟

ستخضع للتخدير (دواء يساعدك على الاسترخاء) خلال هذا الإجراء.

- ستحتاج إلى شخص بالغ ومسؤول:
 - < ليبقى معك في المستشفى أثناء خضوعك للإجراء.
 - < ليصحبك إلى المنزل بعد انتهاء الإجراء.
 - < ليملك معك طوال الليل.
- في حال لم يكن هذا ممكناً، اتصل بطبيبك قبل موعد الإجراء. قد نضطر في هذه الحالة إلى إلغاء هذا التنظير.

في الليلة التي تسبق الإجراء

- يجب الامتناع عن الأكل والشرب، بما في ذلك الماء، بعد منتصف الليل من الليلة التي تسبق الإجراء.

في حال احتجت إلى إلغاء الإجراء، الرجاء الاتصال بنا لنتمكن من إعطاء هذا الموعد إلى مريض آخر.

< رقم الهاتف: _____

في اليوم المحدد لإجراء التنظير من المهم جدًا اتباع التعليمات التالية:

- في حال كنت تأخذ منشطات أو أدوية لأمراض القلب، ضغط الدم أو التنفس.
 - < بإمكانك أن تأخذ دواءك كالمعتاد، مع شرب الماء في رشفات صغيرة.
- في حال تم ترتيب موعد لإجراء التنظير عند الظهر أو ما بعد ذلك، اسأل ما إذا كان بإمكانك تناول المشروبات الصافية قبل الساعة 8 صباحًا. تشمل المشروبات الصافية:
 - < الماء
 - < العصائر الخالية من اللب (مثل عصير التفاح، العنب أو الكرايبيري). لا تشرب عصير البرتقال.
 - < المشروبات الرياضية
- لا تشرب:
 - < القهوة أو الشاي
 - < منتجات الحليب
 - < عصير البرتقال
- أحضر معك إلى المستشفى قائمة بالأدوية التي تتناولها (بما في ذلك الأدوية التي تُصرف بوصفة طبية أو بدونها، أجهزة الاستنشاق، الكريمات، قطرات العين، اللصقات الجلدية، الأدوية العشبية، الفيتامينات، والمكملات الغذائية).
- امتنع عن وضع المجوهرات أو حمل أي أغراض ثمينة لدى حضورك إلى المستشفى. فالمستشفى ليست مسؤولة عن فقدان أي من أغراضك.

- لا تستخدم المنتجات العطرية. فهبئة الصحة في نونف سكوشف ببة ءفلف من الروفف.

أفن أفهب لإءرف الففففر؟

ببب الففففر فف الكففك الموفوب فف:

< الففبب الرففسف من مبنى ففكسون أو مبنى سنففنفل
(المءافل الرففسفة)

أو

< الففبب الرفرف (مءفل شارف روفف)

بمكن إءرف الففففر فف:

- وءة الففففر الفافل
الففبب الفففف، مبنى ففكفورفا
مففففف ففكفورفا الففف، مركز كفو إف فو (QE II)

أو

- عفاة الإءرف الفففة البسفة
الففبب الرفرف، مءفل شارف روفف
هالفففكس إنفرمفر

بفم إءرف الففففر فف ءرفة عملفء أو فف قسم الففففر بالفشعة.
سبفلفك فرفف الرفرفة الفففة عن مكان إءرف الففففر
وسبزوذك بالفرفشءاء الفلزمة.

كيف يتم إجراء التنظير؟

- سيتم حقنك بأدوية عن طريق وريد في ذراعك من أجل:
 - < مساعدتك على الاسترخاء
 - < للتخفيف من أي ألم قد تشعر به
 - < للتقليل من السعال
- سيطلب منك الغرغرة بدواء لتجميد السوائل. كما من المحتمل أن يتم إعطاؤك دواء لتجميد السوائل لاستنشاقه عبر قناع رذاذ (الأكسجين)، ما يسهم في تسهيل عملية إدخال منظار القصبات على الأخصائي.
- سيتم رش رذاذ مخدر في الجزء الخلفي من الحلق، وفي الأنف أحياناً، حتى لا تشعر بأي ألم.
- سيتم قياس مستوى الأكسجين في دمك، كما سيتم تزويدك بجرعة إضافية من الأكسجين لمساعدتك على التنفس.
- سيتم التحقق من معدل ضربات القلب وضغط الدم.
- سيتم تمرير منظار القصبات عبر الفم أو الأنف وصولاً إلى الرغامى.
- قد يُستخدم المنظار لأخذ خزعة أو عينة.
- يستغرق التنظير حوالي 30 دقيقة.

ماذا سيحصل بعد انتهاء التنظير؟

- امتنع عن الأكل والشرب لمدة ساعتين بعد انتهاء التنظير. يساعد ذلك على منع الأطعمة والسوائل من دخول المسالك الهوائية أو الرئتين.
- من المحتمل أن تعاني من:
 - < بحة في الصوت أو التهاب في الحلق لأن المنظار مرّ عبر الحنجرة
 - < السعال
 - < السعال المصحوب بكميات قليلة من الدم خاصة في حال تمّ أخذ خزعة أو عينة
- ستتمكن من العودة إلى المنزل بعد ساعة 1 تقريباً من انتهاء التنظير.

خلال ال 24 ساعة التي تلي التخدير:

- امتنع عن قيادة السيارة أو استخدام أي آلات ثقيلة.
- لا تشرب الكحول.
- لا تتولّ رعاية أي شخص (بما في ذلك الأطفال).
- لا توقع على أي أوراق قانونية أو هامة، أو تتخذ أي قرارات مالية (متعلقة بالنقود).

- من الممكن أن تعاني من الحمى (درجة حرارة تتجاوز 38 درجة مئوية أو 100.4 درجة فهرنهايت) بعد تنظير القصبات.
- < اتصل بالطبيب الذي أجرى التنظير في حال استمرت الحمى لأكثر من 24 ساعة.

اتصل فورًا بالرقم 911 أو توجه إلى أقرب قسم طوارئ

في حال كنت تعاني من:

- < السعال المصحوب بكميات غزيرة من الدم
- < صعوبة في التنفس
- < ألم في الصدر

هل لديك أسئلة؟

يرجى توجيه أسئلتك إلى أحد أعضاء فريق الرعاية.

نحن هنا لمساعدتك.

ملاحظات:

إن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة مخصصة لأهداف تثقيفية فقط. هذه المعلومات ليست معدة لتكون أو تقوم مقام الرعاية الصحية أو المشورة الطبية. قد لا تنطبق هذه المعلومات على جميع الحالات. إذا كانت لديك أي أسئلة، الرجاء الاتصال بمزود الرعاية الصحية الخاص بك.

يمكنك العثور على هذا الدليل وكافة موارد المرضى التي نوفرها على الموقع التالي:

<https://library.nshealth.ca/Patients-Guides>

(متوفر فقط باللغة الإنجليزية)

تواصل مع ممرضة مجازة بنوفا سكوشا في أي وقت، عبر الاتصال على الرقم 811 أو زيارة

<https://811.novascotia.ca>

(متوفر فقط باللغة الإنجليزية)

من إعداد: وحدة الأمراض التنفسية، مستشفى فيكتوريا العام، مركز كيو إي تو (QE II)

الرسوم التوضيحية من:

LifeART Super Anatomy 1 Images, Copyright © 1994,
TechPool Studios Corp. USA

من تصميم: خدمات مكتبة هيئة الصحة بنوفا سكوشا