

البرنامج المدرسي للتحصين

ما الذي يمكن توقعه بعد الحصول على اللقاحات التالية:

- لقاح التهاب الكبد ب
- لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV 9)
- اللقاح الرباعي ضد السحايا لقاح
- التيتانوس، الدفتريا، والشاهوق غير الخلوي

إذا لم تكن متأكدًا، اسأل!

إذا كنت ترغب في طرح أي أسئلة حول اللقاح، أو إذا لم تفهم أي معلومات، يرجى الاتصال بمكتب الصحة العامة في منطقتك. ستجد معلومات الاتصال في كتيب البرنامج المدرسي للتحصين.

هل تظهر أي آثار جانبية بعد الحصول على التطعيم؟

لا يعاني معظم الأشخاص من أي آثار جانبية بعد حصولهم على التطعيم. تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً الاحمرار، الورم، أو الألم في موضع وخزة الإبرة. أما الآثار الجانبية الأقل شيوعاً فهي تتضمن صداع خفيف، ارتفاع بسيط في حرارة الجسم، رعشة، إسهال، غثيان، أو جوع في الجسم، قلة نشاط، وألم أو تورم في المفاصل.

ما الذي يمكنني فعله في حال حدوث ردة فعل تحسسية أو ارتفاع في الحرارة؟

بعد حصول الطالب على اللقاح، سيخضع للمراقبة لمدة 15 دقيقة على الأقل، نظراً لوجود احتمال بسيط في حدوث ردة فعل تحسسية حادة. تظهر عادة الحساسية الحادة بعد تلقي اللقاح بفترة وجيزة.

تتولى الممرضة الإشراف على طفلك لتتمكن من الاعتناء به إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.

في حال ارتفعت حرارة طفلك، قد يتوجب عليك علاجه في المنزل بعد تلقيه اللقاح. تأكد من أنه لديك دواء الأستيامينوفين أو الأيبوبروفين في المنزل من باب الاحتياط.

لا يعتبر ارتفاع حرارة الجسم من العلامات المقلقة بالضرورة، ولكنها قد تكون مزعجة. إذا شعرت بارتفاع حرارة الطالب، اتبعوا الخطوات التالية:

- قياس الحرارة.
- إعطاء الأستيامينوفين أو الأيبوبروفين في حال تجاوزت الحرارة ٥,٨٣ درجة مئوية (101 فهرنهايت)، مع اتباع التعليمات المدونة على العبوة.
- تشجيع الطفل على تناول كمية إضافية من السوائل كالماء والعصائر.

اتصل بمزود الرعاية الصحية أو على الرقم 811 في حال :

- استمرت الحرارة لأكثر من 24 ساعة
- بلغت أو تجاوزت الحرارة 39.5 درجة مئوية (103 درجة فهرنهايت)
- للم تنخفض الحرارة بعد إعطاء الأستيامينوفين أو الأيبوبروفين
- بدا مريضاً ويعاني من أعراض أخرى