INFORMATION SUR LE VACCINATION

Le vaccin conjugué contre le méningocoque groupe C

Qu'est-ce que l'infection à méningocoque groupe C?

- L'infection à méningocoque groupe C est causée par une bactérie (Neisseria meningitidis) connue sous le nom de méningocoque.
- De nombreuses personnes sont porteuses de la bactérie, au fond de la gorge ou dans le nez, sans être malades.
- Parfois, il arrive que cette bactérie outrepasse les défenses naturelles du corps et cause des maladies graves comme la méningite (infection des membranes du cerveau) ou la méningococcémie (infection généralisée qui affecte le sang et plusieurs organes). Si l'une de ces maladies survient, on parle alors d'infection invasive à méningocoque, qui constitue un danger de mort.
- Le groupe C est l'une des souches de la bactérie qui cause l'infection à méningocoque.
- Certains enfants peuvent devenir sourds ou subir des lésions aux reins, des amputations ou des pertes auditives comme suite à une infection à méningocoque.
- La maladie peut être prévenue par un vaccin.

Qu'est-ce que le vaccin conjugué contre le méningocoque groupe C?

- Le vaccin conjugué contre le méningocoque groupe C est destiné à la prévention de l'infection causée par la souche du méningocoque groupe C.
- Il protège uniquement contre la maladie causée par la souche du groupe C.
- Il ne protège pas contre d'autres souches de cette bactérie ou contre d'autres organismes capable de causer une méningite ou une septicémie.
- Ce vaccin est administré par injection et ne peut pas provoquer d'infection à méningocoque groupe C car il ne contient pas de bactéries vivantes.

Qui devrait recevoir le vaccin conjugué contre le méningocoque groupe C?

- Le Programme de vaccination pour les enfants, les jeunes et les adultes de la Nouvelle-Écosse recommande que ce vaccin soit administré aux bébés âgés de 12 mois. Si ce vaccin n'a pas été reçu, il peut tout de même être administré dans le cadre du calendrier vaccinal jusqu'au 5e anniversaire.
- Les personnes susceptibles d'être exposées à la bactérie méningococcique et celles qui présentent un risque élevé de contracter une infection à méningocoque devraient envisager de recevoir ce vaccin.

Certaines personnes doivent consulter un fournisseur de soins de santé avant de recevoir ce vaccin :

- Les personnes atteintes de thrombocytopénie ou d'autres troubles de saignement.

Qui ne devrait PAS recevoir le vaccin conjugué contre le méningocoque groupe C?

- Les personnes qui ont déjà eu une réaction allergique grave à une dose précédente ou à toute composante du conjugué contre le méningocoque groupe C.
- Les personnes qui sont malades ou qui font de la fièvre (température de 38,5 °C/101,3 °F ou plus).

Veuillez lire l'information au verso.

www.nshealth.ca/immunizations
(En anglais seulement) 13106/MAY26

santé nouvelle-écosse

SOINS APRÈS LA VACCINATION

Le vaccin conjugué contre le méningocoque groupe C

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après l'administration d'un vaccin pour permettre de surveiller une réaction possible au vaccin. Comme pour tous les vaccins, il existe une faible possibilité qu'une réaction plus grave se produise.

Quels sont les effets secondaires possibles du vaccin?

- Comme pour tout autre vaccin, les effets secondaires les plus courants sont de la douleur, de la rougeur ou de l'enflure au site d'injection, de la fatigue et de la fièvre.
- Fièvre et irritabilité, qui ont été signalées chez les jeunes enfants. La fièvre peut survenir 4 à 6 heures après la vaccination, mais ne dure pas plus de 24 heures.

Il est possible de faire de la fièvre après la vaccination. Veuillez donc vous assurer d'avoir de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène à la maison. Suivez les instructions figurant sur l'emballage. Consultez votre prestataire de soins de santé avant d'utiliser l'un ou l'autre de ces médicaments, car ils ne sont pas recommandés pour les personnes ayant certains problèmes de santé.

Appelez votre prestataire de soins de santé dans les situations suivantes :

- Fièvre qui dure plus de 24 heures
- Fièvre de 38,5 °C (101,3 °F) ou plus
- Fièvre qui ne baisse pas après avoir pris de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène
- Convulsions
- Apparition d'autres troubles ou symptômes

Questions?

Si vous avez des questions concernant le vaccin conjugué contre le méningocoque groupe C, veuillez communiquer avec le bureau local de la santé publique (voir la liste des bureaux à www.nshealth.ca/public-health-offices) ou avec votre fournisseur de soins de santé.

Pour plus d'information sur l'immunisation, veuillez consulter les sites Web suivants :

Santé Nouvelle-Écosse, Santé publique
https://www.nshealth.ca/immunizations

Immunisation Canada
https://www.immunize.ca/fr

Agence de la santé publique du Canada
https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html/

811 à https://811.novascotia.ca/?lang=fr

www.nshealth.ca/immunizations
(En anglais seulement)

13106/MAY26

santé nouvelle-écosse