

# Programme scolaire de vaccination

## À QUOI S'ATTENDRE APRÈS AVOIR ÉTÉ VACCINÉ CONTRE :

l'hépatite B

le virus du papillome  
humain

l'infection à  
méningocoques

le tétanos, la diphtérie et  
la coqueluche acellulaire

### EN CAS DE DOUTE, POSEZ DES QUESTIONS.

*Si vous avez des questions sur les vaccins, ou si vous ne comprenez pas quelque chose, communiquez avec le bureau de la Santé publique de votre région. Vous trouverez les coordonnées des bureaux dans le livret du programme de vaccination des élèves.*

### QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES DES VACCINS?

De nombreuses personnes n'ont aucun effet secondaire après la vaccination.

Les effets secondaires les plus courants sont une douleur, une rougeur ou une enflure à l'endroit de la piqûre.

Il y a d'autres effets secondaires moins fréquents, comme un léger mal de tête, une fièvre, des frissons, la diarrhée, des nausées, des douleurs généralisées, la fatigue et des articulations endolories ou enflées.

### QUE DOIS-JE FAIRE EN CAS DE RÉACTION OU DE FIÈVRE?

Après avoir reçu son ou ses vaccins, l'élève sera en observation pendant au moins 15 minutes. Cela s'explique par un faible risque de réaction allergique grave peu après l'administration du vaccin.

En surveillant l'enfant pendant 15 minutes, le personnel infirmier sera en mesure de prendre en charge toute réaction éventuelle.

Si une fièvre apparaît après la vaccination, vous devrez peut-être la traiter à la maison. Assurez-vous d'avoir de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène en cas de besoin.

Une fièvre n'est pas forcément mauvaise, mais elle peut être gênante. Si vous croyez que l'enfant a de la fièvre :

- Prenez sa température.
- Donnez-lui de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène en suivant les instructions figurant sur l'emballage si la température est supérieure à 38,5 °C (101,3 °F).
- Encouragez-le à boire PLUS que d'habitude, comme du jus ou de l'eau.

### COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE FOURNISSEUR DE SOINS DE SANTÉ OU COMPOSEZ LE 811 SI :

- la fièvre dure plus de 24 heures;
- l'enfant a une température de 38,5 °C (101,3 °F) ou plus;
- la fièvre ne baisse pas dans un délai de 15 à 45 minutes après la prise d'acétaminophène ou d'ibuprofène;
- l'enfant semble malade et présente d'autres symptômes.

*Also available in English.*