INFORMATION SUR LE VACCINATION

# Le vaccin contre la diphtérie, la coqueluche acellulaire et le tétanos (dcaT)

## Qu'est-ce que la diphtérie?

- La diphtérie est une maladie très grave causée par une bactérie.
- Elle peut provoquer une infection du nez et de la gorge qui peut rendre la respiration difficile.
- Elle peut provoquer une infection de la peau.
- Elle peut entraîner une insuffisance cardiaque ou une paralysie.
- Même avec un traitement, environ 1 personne atteinte de diphtérie respiratoire sur 10 décède. Sans traitement, jusqu'à la moitié des personnes atteintes peuvent mourir de la maladie.
- La diphtérie peut être évitée grâce à la vaccination.

## Qu'est-ce que la coqueluche?

- La coqueluche est causée par une bactérie.
- Elle peut provoquer de violentes quintes de toux qui peuvent rendre la respiration difficile. La maladie dure généralement entre 6 et 12 semaines.
- Elle peut entraîner une pneumonie.
- Elle peut provoquer des convulsions et, dans certains cas, entraîner la mort.
- La coqueluche peut être évitée grâce à la vaccination.

## Qu'est-ce que le tétanos?

- Le tétanos est également appelé « trismus ».
- Il s'agit d'une maladie qui survient lorsque des coupures, des plaies ou des brûlures sont infectées par la bactérie du tétanos.
- Cette bactérie, que l'on trouve partout où il y a de la poussière, de la saleté, de la terre ou des matières fécales, produit une toxine qui provoque des spasmes musculaires dans tout le corps.
- Cette maladie peut mettre la vie en danger.
- Le tétanos peut être évité grâce à la vaccination.

**www.nshealth.ca/immunizations**

*(En anglais seulement)*

13175/MAY26 REV24-25

## En quoi consiste le vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos?

- Le dcaT est un vaccin unique qui protège contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche.
- Le vaccin dcaT est la meilleure façon de prévenir la diphtérie, la coqueluche et le tétanos.
- Il est administré par injection.

## Qui devrait recevoir le vaccin dcaT?

En Nouvelle-Écosse, le vaccin dcaT est systématiquement proposé aux élèves de 7e année dans le cadre du Programme scolaire de vaccination. Si le vaccin n'a pas été administré ou a été refusé dans le cadre du Programme scolaire de vaccination en 7e année, il est toujours possible de se faire vacciner gratuitement dans le cadre du programme de vaccination financé par des fonds publics.

- Une dose pour les personnes de moins de 19 ans qui n'ont pas été vaccinées en 7e année
- Une dose à l'âge adulte
- Une dose à chaque grossesse
- Série primaire de vaccination contre le tétanos chez les personnes de 7 ans et plus ne nécessitant pas de doses supplémentaires du vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI)

## Qui NE devrait PAS recevoir le vaccin dcaT?

- Les personnes qui ont déjà eu une réaction allergique grave à une dose précédente ou à toute composante du vaccin dcaT.
- Les personnes qui sont malades ou qui font de la fièvre (température de 38,5 °C/101,3 °F ou plus).

***Veuillez lire l'information au verso.***

santé nouvelle-écosse

SOINS APRÈS LA VACCINATION

# Le vaccin contre la diphtérie, la coqueluche acellulaire et le tétanos (dcaT)

***Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après l'administration d'un vaccin pour permettre de surveiller une réaction possible au vaccin. Comme pour tous les vaccins, il existe une faible possibilité qu'une réaction plus grave se produise.***

## Quels sont les effets secondaires possibles du vaccin?

- Comme pour tout autre vaccin, les effets secondaires les plus courants sont de la douleur, de la rougeur ou de l'enflure au site d'injection.
- Autres effets secondaires moins fréquents : maux de tête légers, fièvre, diarrhée, nausées, frissons, courbatures, baisse d'énergie et articulations douloureuses ou enflées.

***Il est possible de faire de la fièvre après la vaccination. Veuillez donc vous assurer d'avoir de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène à la maison. Suivez les instructions figurant sur l'emballage. Consultez votre prestataire de soins de santé avant d'utiliser l'un ou l'autre de ces médicaments, car ils ne sont pas recommandés pour les personnes ayant certains problèmes de santé.***

### Appelez votre prestataire de soins de santé dans les situations suivantes :

- Fièvre qui dure plus de 24 heures
- Fièvre de 38,5 °C (101,3 °F) ou plus
- Fièvre qui ne baisse pas après avoir pris de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène
- Apparition d'autres troubles ou symptômes

## Questions?

Si vous avez des questions concernant la diphtérie, la coqueluche, le tétanos ou le vaccin dcaT, veuillez communiquer avec votre bureau de santé publique local (voir la liste des bureaux à *www.nshealth.ca/public-health* — en anglais seulement) ou avec votre fournisseur de soins de santé.

Pour plus d'information sur la vaccination, veuillez consulter les sites Web suivants:

**Santé Nouvelle-Écosse Santé publique**
www.nshealth.ca/immunizations *(en anglais seulement)*

**Immunisation Canada**
immunize.ca/fr

**Agence de la santé publique du Canada**
www.canada.ca/fr/sante-publique

**Société canadienne de pédiatrie**
cps.ca/fr

**811**
811.novascotia.ca/?lang=fr