INFORMATION SUR LE VACCINATION

Le vaccin conjugué contre le pneumocoque

Qu'est-ce qu'une infection pneumococcique?

- Une infection pneumococcique est causée par une bactérie (streptococcus pneumoniae) communément appelée « pneumocoque ».
- De nombreuses personnes sont porteuses de la bactérie au fond de la gorge ou dans le nez sans être malades.
- Il arrive que la bactérie passe à travers les défenses naturelles du corps et cause des infections graves, voire mortelles, notamment:
  - » La méningite (infection de la membrane qui recouvre le cerveau)
  - » La bactériémie (infection généralisée qui affecte le sang et plusieurs organes)
  - » La pneumonie (infection pulmonaire)
- La bactérie pneumocoque provoque également des otites moyennes.
- La bactérie commence à résister à certains des médicaments utilisés pour la combattre. Par conséquent, il est plus important que jamais de prévenir les infections pneumococciques.
- Il est possible de prévenir la plupart des infections pneumococciques par la vaccination.

En quoi consiste le vaccin conjugué contre le pneumocoque?

- Le vaccin conjugué contre le pneumocoque vise la prévention de l'infection pneumococcique.
- Il protège contre les souches de bactéries pneumococciques les plus communes.

Qui ne devrait pas recevoir le vaccin conjugué contre le pneumocoque?

- Les personnes qui ont déjà eu une réaction allergique grave à une dose précédente ou à toute composante du vaccin conjugué contre le pneumocoque.
- Les personnes qui sont malades ou qui font de la fièvre (température de 38,5 °C/101,3 °F ou plus).

Qui devrait recevoir le vaccin conjugué contre le pneumocoque?

Le calendrier de vaccination de la Nouvelle-Écosse recommande que ce vaccin soit administré:

- Aux bébés âgés de 2 mois, 4 mois et 12 mois dans le cadre de la vaccination systématique.
- Aux adultes de 65 ans et plus qui n'ont pas encore reçu de vaccin antipneumococcique dans le cadre du programme de vaccination universelle des personnes âgées.
- Toute personne âgée de 2 mois à 18 ans, ainsi que les adultes de 50 ans et plus dont l'asthme a exigé des soins médicaux de courte durée au cours des 12 derniers mois.
- Personnes fumeuses de 50 ans et plus
- À toute personne âgée de 2 mois ou plus présentant les conditions médicales ou de vie à risque élevé suivantes, dans le cadre de leur vaccination avant exposition:
  - » Asthme ayant nécessité des soins médicaux actifs au cours des 12 derniers mois (entre l'âge de 2 mois et le 18e anniversaire)
  - » Cancers
  - » Diabète
  - » Écoulement chronique de liquide céphalorachidien
  - » Fibrose kystique
  - » Immunodéficience congénitale
  - » Implants cochléaires (y compris toute personne devant recevoir des implants)
  - » Maladie chronique du cœur, du foie, des poumons ou des reins
  - » Maladies neurologiques chroniques pouvant affecter la capacité de la personne à se débarrasser de la salive dans sa bouche
  - » Sans-abrisme
  - » Traitement immunosuppresseur
  - » Transplantation de cellules souches hématopoïétiques (TCSH)
  - » Transplantation d'un organe plein
  - » Troubles de la rate, y compris l'asplénie et d'autres hémoglobinopathies
  - » Usage de substances ou consommation nocive d'alcool
  - » Vie dans des communautés ou des environnements présentant des taux élevés de pneumococcies invasives (PI) comme déterminés par la Santé publique
  - » Vie dans un établissement de soins de longue durée
  - » Vie en établissement pour enfants ayant des besoins médicaux complexes
  - » VIH

Veuillez lire l'information au verso.

www.nshealth.ca/immunizations

(En anglais seulement)

13176/MAR26

santé nouvelle-écosse

SOINS APRÈS
LA VACCINATION

Le vaccin conjugué contre le pneumocoque

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après l'administration d'un vaccin pour permettre de surveiller une réaction possible au vaccin. Comme pour tous les vaccins, il existe une faible possibilité qu'une réaction plus grave se produise.

Quels sont les effets secondaires possibles du vaccin contre le pneumocoque?

Beaucoup de gens n'ont aucun effet secondaire après avoir été vaccinés. Toutefois, certains peuvent:

- Ressentir de la douleur, avoir une rougeur ou de l'enflure au point d'injection. Votre enfant pourrait ne pas vouloir utiliser le bras ou la jambe qui a reçu l'injection autant qu'avant. Tout cela devrait disparaître après quelques jours;
- Avoir de la fièvre dans les 4 à 6 heures qui suivent l'injection, mais la fièvre ne devrait pas durer plus de 24 heures.

Il est possible de faire de la fièvre après la vaccination. Veuillez donc vous assurer d'avoir de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène à la maison. Suivez les instructions figurant sur l'emballage. Consultez votre prestataire de soins de santé avant d'utiliser l'un ou l'autre de ces médicaments, car ils ne sont pas recommandés pour les personnes ayant certains problèmes de santé.

Appelez votre prestataire de soins de santé dans les situations suivantes :

- Fièvre qui dure plus de 24 heures
- Fièvre de 38,5 °C (101,3 °F) ou plus
- Fièvre qui ne baisse pas après avoir pris de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène
- Convulsions
- Apparition d'autres troubles ou symptômes

Questions?

Si vous avez des questions concernant le vaccin conjugué contre le pneumocoque, veuillez communiquer avec le bureau local de la santé publique (voir la liste des bureaux à *www.nshealth.ca/public-health* — en anglais seulement) ou avec votre fournisseur de soins de santé.

Pour plus d'information sur l'immunisation, veuillez consulter les sites web suivants:

Santé Nouvelle-Écosse Santé publique
www.nshealth.ca/immunizations
(en anglais seulement)

Immunisation Canada
immunize.ca/fr

Agence de la santé publique du Canada
www.canada.ca/fr/sante-publique

Société canadienne de pédiatrie
cps.ca/fr

811
811.novascotia.ca/?lang=fr

www.nshealth.ca/immunizations

(En anglais seulement) 13176/MAR26

santé nouvelle-écosse