INFORMATION SUR LE VACCINATION

Le vaccin contre la diphtérie et le tétanos (dT)

Qu'est-ce que la diphtérie?

- La diphtérie est une maladie très grave causée par une bactérie.
- Elle peut provoquer une infection du nez et de la gorge qui peut rendre la respiration difficile.
- Elle peut provoquer une infection de la peau.
- Elle peut entraîner une insuffisance cardiaque ou une paralysie.
- Même avec un traitement, environ 1 personne atteinte de diphtérie respiratoire sur 10 décède. Sans traitement, jusqu'à la moitié des personnes atteintes peuvent mourir de la maladie.
- La diphtérie peut être évitée grâce à la vaccination.

Qu'est-ce que le tétanos?

- Le tétanos est également appelé « trismus ».
- Il s'agit d'une maladie qui survient lorsque des coupures, des plaies ou des brûlures sont infectées par la bactérie du tétanos.
- Cette bactérie, que l'on trouve partout où il y a de la poussière, de la saleté, de la terre ou des matières fécales, produit une toxine qui provoque des spasmes musculaires dans tout le corps.
- Cette maladie peut mettre la vie en danger.
- Le tétanos peut être évité grâce à la vaccination.

En quoi consiste le vaccin contre la diphtérie et le tétanos (dT)?

- Le vaccin dT est un vaccin unique qui protège contre le tétanos et la diphtérie.
- Le vaccin dT offre la meilleure protection contre la diphtérie et le tétanos.
- Il est administré par injection.

Qui devrait recevoir le vaccin dT?

- Le Programme de vaccination pour les enfants, les jeunes et les adultes de la Nouvelle-Écosse recommande une dose du vaccin dcaT (vaccin dT et vaccin contre la coqueluche) à l'âge adulte, suivie de doses de rappel du vaccin dT tous les 10 ans.

Qui NE devrait PAS recevoir le vaccin dT?

- Les personnes qui ont déjà eu une réaction allergique grave à une dose précédente ou à toute composante du vaccin dT.
- Les personnes qui sont malades ou qui font de la fièvre (température de 38,5 °C/101,3 °F ou plus).

Veuillez lire l'information au verso.

www.nshealth.ca/immunizations

(En anglais seulement)

13177/MAY26 REV25-26

santé nouvelle-écosse

SOINS APRÈS LA VACCINATION

Le vaccin contre la diphtérie et le tétanos (dT)

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après l'administration d'un vaccin pour permettre de surveiller une réaction possible au vaccin. Comme pour tous les vaccins, il existe une faible possibilité qu'une réaction plus grave se produise.

Quels sont les effets secondaires possibles du vaccin dT?

- Comme pour tout autre vaccin, les effets secondaires les plus courants sont de la douleur, de la rougeur ou de l'enflure au site d'injection.
- Une petite bosse sans douleur peut apparaître au site d'injection et persister pendant quelques semaines.

Il est possible de faire de la fièvre après la vaccination. Veuillez donc vous assurer d'avoir de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène à la maison. Suivez les instructions figurant sur l'emballage. Consultez votre prestataire de soins de santé avant d'utiliser l'un ou l'autre de ces médicaments, car ils ne sont pas recommandés pour les personnes ayant certains problèmes de santé.

Appelez votre prestataire de soins de santé dans les situations suivantes :

- Fièvre qui dure plus de 24 heures
- Fièvre de 38,5 °C (101,3 °F) ou plus
- Fièvre qui ne baisse pas après avoir pris de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène
- Apparition d'autres troubles ou symptômes

Questions?

Si vous avez des questions concernant la diphtérie, le tétanos ou le vaccin dT, veuillez communiquer avec le bureau local de la santé publique (voir la liste des bureaux à *www.nshealth.ca/public-health* — en anglais seulement) ou avec votre fournisseur de soins de santé.

Pour plus d'information sur la vaccination, veuillez consulter les sites Web suivants:

Santé Nouvelle-Écosse Santé publique
www.nshealth.ca/immunizations *(en anglais seulement)*

Immunisation Canada
immunize.ca/fr

Agence de la santé publique du Canada
www.canada.ca/fr/sante-publique

Société canadienne de pédiatrie
cps.ca/fr

811
811.novascotia.ca/?lang=fr