INFORMATION SUR LE VACCINATION

Le vaccin contre la diphtérie, la coqueluche acellulaire, le tétanos, la polio et Hib (DCaT-VPI-Hib)

Qu'est-ce que la diphtérie?

- La diphtérie est une maladie très grave causée par une bactérie.
- Elle peut provoquer une infection du nez et de la gorge qui peut rendre la respiration difficile.
- Elle peut provoquer une infection de la peau.
- Elle peut entraîner une insuffisance cardiaque ou une paralysie.
- Même avec un traitement, environ 1 personne atteinte de diphtérie respiratoire sur 10 décède. Sans traitement, jusqu'à la moitié des personnes atteintes peuvent mourir de la maladie.
- La diphtérie peut être évitée grâce à la vaccination.

Qu'est-ce que la coqueluche?

- La coqueluche est causée par une bactérie.
- Elle peut provoquer de violentes quintes de toux qui peuvent rendre la respiration difficile. La maladie dure généralement entre 6 et 12 semaines.
- Elle peut entraîner une pneumonie.
- Elle peut provoquer des convulsions et, dans certains cas, entraîner la mort.
- La coqueluche peut être évitée grâce à la vaccination.

Qu'est-ce que le tétanos?

- Le tétanos est également appelé « trismus ».
- Il s'agit d'une maladie qui survient lorsque des coupures, des plaies ou des brûlures sont infectées par la bactérie du tétanos.
- Cette bactérie, que l'on trouve partout où il y a de la poussière, de la saleté, de la terre ou des matières fécales, produit une toxine qui provoque des spasmes musculaires dans tout le corps.
- Cette maladie peut mettre la vie en danger.
- Le tétanos peut être évité grâce à la vaccination.

Qu'est-ce que la polio?

- La polio est une maladie causée par un virus. Elle peut entraîner une paralysie, une incapacité de longue durée ou la mort.
- La paralysie peut toucher les muscles nécessaires à la respiration.
- La polio a été éradiquée au Canada grâce à la vaccination.

Qu'est-ce que l'Haemophilus influenzae de type b (Hib)?

- Il s'agit d'une bactérie pouvant provoquer une maladie grave susceptible d'entraîner une paralysie permanente, des convulsions et, dans certains cas, la mort.
- Chez les enfants de moins de 5 ans, le Hib est l'une des principales causes de:
  - » Infection des membranes qui recouvrent le cerveau et la moelle épinière (méningite).
  - » Enflure du tissu qui recouvre la trachée (épiglottite). Elle peut entraîner de graves problèmes respiratoires si elle n'est pas traitée.
- Le Hib peut également causer:
  - » Infection des poumons (pneumonie).
  - » Infection de la membrane qui entoure le cœur (péricardite).
  - » Infection osseuse (ostéomyélite).
  - » Accumulation de pus dans les poumons (empyème).
  - » Arthrite infectieuse.
  - » Infection sanguine (bactériémie).
- Cette maladie peut être évitée grâce à la vaccination.

Qu'est-ce que le vaccin DCaT-VPI-Hib?

- Le vaccin DCaT-VPI-Hib est un vaccin qui protège contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la polio et l'Haemophilus influenzae de type b (Hib).
- La vaccination est le meilleur moyen de prévenir la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la polio et l'Haemophilus influenzae de type b.
- Le vaccin est administré par injection.

Qui devrait recevoir le vaccin DCaT-VPI-Hib?

- Le Programme de vaccination pour les enfants, les jeunes et les adultes de la Nouvelle-Écosse recommande que les enfants de 2 mois à moins de 7 ans reçoivent 4 doses de ce vaccin.
- Il est recommandé d'administrer ces doses à l'âge de 2, 4, 6 et 18 mois.

Veuillez lire l'information au verso.

www.nshealth.ca/immunizations

(En anglais seulement)

13179/MAY26 REV25-26

santé nouvelle-écosse

SOINS APRÈS LA VACCINATION

Le vaccin contre la diphtérie, la coqueluche acellulaire, le tétanos, la polio et Hib (DCaT-VPI-Hib)

Qui NE devrait pas recevoir le vaccin DCaT-VPI-Hib?

- Les personnes ayant déjà eu une réaction allergique grave à une dose précédente ou à l'une des composantes du vaccin DCaT-VPI-Hib.
- Les personnes malades ou faisant de la fièvre (température égale ou supérieure à 38,5 °C/101,3 °F).

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après l'administration d'un vaccin pour permettre de surveiller une réaction possible au vaccin. Comme pour tous les vaccins, il existe une faible possibilité qu'une réaction plus grave se produise.

Quels sont les effets secondaires possibles du vaccin?

- Comme pour tout autre vaccin, les effets secondaires les plus courants sont de la douleur, de la rougeur ou de l'enflure au site d'injection.
- Il se peut que votre enfant utilise moins le bras ou la jambe où l'injection a été faite. Cette réaction disparaîtra au bout de quelques jours.
- Une irritabilité et une perte d'appétit sont également possibles chez les jeunes enfants.
- Une petite bosse sans douleur peut apparaître au site d'injection et persister pendant quelques semaines.
- Effets secondaires moins fréquents : fièvre, frissons ou courbatures, maux de tête, diarrhée, nausées ou vomissements, fatigue, articulations douloureuses ou enflées.
- Après la vaccination, des effets secondaires plus graves, comme une forte fièvre ou des convulsions, ont été signalés dans de rares cas chez des enfants.

Il est possible de faire de la fièvre après la vaccination. Veuillez donc vous assurer d'avoir de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène à la maison. Suivez les instructions figurant sur l'emballage. Consultez votre prestataire de soins de santé avant d'utiliser l'un ou l'autre de ces médicaments, car ils ne sont pas recommandés pour les personnes ayant certains problèmes de santé.

Appelez votre prestataire de soins de santé dans les situations suivantes :

- Fièvre qui dure plus de 24 heures
- Fièvre de 38,5 °C (101,3 °F) ou plus.
- Fièvre qui ne baisse pas après avoir pris de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène
- Convulsions
- Présence d'autres troubles ou symptômes

Questions?

Si vous avez des questions au sujet de la diphtérie, de la coqueluche, du tétanos, de la polio, du Hib ou du vaccin DCaT-VPI-Hib, veuillez communiquer avec votre bureau local de la santé publique (voir la liste des bureaux à www.nshealth.ca/public-health-offices) ou votre fournisseur de soins de santé.

Pour plus d'information sur l'immunisation, consultez les sites Web suivants :

Santé Nouvelle-Écosse Santé publique
www.nshealth.ca/immunizations *(en anglais seulement)*

Immunisation Canada
immunize.ca/fr

Agence de la santé publique du Canada
www.canada.ca/fr/sante-publique

Société canadienne de pédiatrie
cps.ca/fr

811
811.novascotia.ca/?lang=fr

www.nshealth.ca/immunizations

(En anglais seulement)

13179/MAY26 REV25-26

santé nouvelle-écosse