INFORMATION SUR LE VACCINATION

Le vaccin contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle (RROV)

Qu'est-ce que la rougelole?

- Il s'agit d'une maladie grave et très contagieuse causée par un virus, qui peut toucher aussi bien les enfants que les adultes.
- Elle peut provoquer des éruptions cutanées (rash), une forte fièvre, de la toux, un écoulement nasal et des larmoiements, pendant 1 à 2 semaines.
- Elle peut entraîner des infections de l'oreille (otites) et une pneumonie.
- Elle peut entraîner une inflammation du cerveau (encéphalite), qui touche environ 1 personne sur 1 000 et peut provoquer des convulsions ou une perte auditive permanente.
- Il s'agit d'une maladie pouvant mettre la vie en danger.
- La rougeole peut être évitée grâce à la vaccination.

Qu'est-ce que les oreillons?

- Il s'agit d'une maladie grave et très contagieuse causée par un virus, qui peut toucher aussi bien les enfants que les adultes.
- Cette maladie se manifeste par de la fièvre, des maux de tête et une inflammation des glandes salivaires, qui entraîne un gonflement des joues.
- Elle peut provoquer une enflure douloureuse des testicules ou des douleurs abdominales.
- Elle peut entraîner une inflammation du cerveau et de la moelle épinière (méningite), une encéphalite ou une perte auditive permanente.
- Les oreillons peuvent être évités grâce à la vaccination.

Qu'est-ce que la rubéole?

- Il s'agit d'une maladie grave et très contagieuse causée par un virus, qui peut toucher aussi bien les enfants que les adultes.
- Elle peut provoquer de la fièvre, une éruption cutanée (rash) et une enflure des ganglions du cou, qui dure environ 3 jours.
- Elle peut entraîner de l'enflure et des douleurs articulaires pouvant durer 1 à 2 semaines.
- Elle peut entraîner un trouble de saignement temporaire (purpura).
- Elle peut provoquer une encéphalite.
- Si elle est contractée pendant la grossesse, la rubéole peut entraîner des malformations chez le fœtus.
- La rubéole peut être évitée grâce à la vaccination.

Qu'est-ce que la varicelle?

- La varicelle est une maladie infantile courante causée par le virus de la varicelle.
- Elle se manifeste généralement par une légère fièvre suivie d'une éruption cutanée (rash) qui pique (démangeaisons).
- Dans de rares cas, elle peut entraîner une maladie grave et nécessiter une hospitalisation. Elle peut mettre la vie en danger.
- Elle peut être plus grave chez les ados et les adultes.
- Elle peut entraîner des complications graves pendant la grossesse, tant pour la personne enceinte que pour le bébé.
- La varicelle est très contagieuse et se transmet facilement d'une personne à l'autre par contact direct ou lorsque l'on respire le même air qu'une personne infectée.
- Elle peut être évitée grâce à la vaccination.

Qu'est-ce que le vaccin RROV?

- Le vaccin RROV est un vaccin qui protège contre quatre maladies.
- Le vaccin RROV contient une quantité minime de virus actif qui est traité spécialement pour l'empêcher de causer la maladie chez les personnes en santé.
- L'immunisation par le vaccin RROV est la meilleure façon de prévenir la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle.
- Le vaccin est administré par injection.
- Quatre-vingt-dix pour cent ou plus des gens qui reçoivent le vaccin sont entièrement protégés, pour toute leur vie.
- Deux doses sont nécessaires pour une protection complète.

Qui devrait recevoir le vaccin RROV?

Le Programme de vaccination pour les enfants, les jeunes et les adultes de la Nouvelle-Écosse recommande l'administration de 2 doses de ce vaccin : une à 12 mois et l'autre à 18 mois.

Si ce vaccin n'a pas été administré, il peut l'être jusqu'à l'âge de 12 ans. D'autres produits peuvent être utilisés après cet âge.

Veuillez lire l'information au verso.

www.nshealth.ca/immunizations

(En anglais seulement)

13182/MAY26

santé nouvelle-écosse

SOINS APRÈS LA VACCINATION

Le vaccin contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle (RROV)

Certaines personnes doivent consulter leur prestataire de soins de santé avant de recevoir ce vaccin :

- Personnes dont le système immunitaire est affaibli en raison d'une maladie ou de la prise de certains médicaments.
- Toute personne ayant reçu un produit sanguin au cours des 3 à 11 derniers mois.

Qui ne devrait PAS recevoir le vaccin RROV?

- Enfants de moins de 12 mois.
- Ce vaccin n'est pas recommandé chez les personnes de plus de 12 ans. Si une personne de plus de 12 ans souhaite se faire vacciner contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle, elle doit recevoir séparément le vaccin RRO et le vaccin contre la varicelle.
- Les personnes qui ont déjà eu une réaction allergique grave à une dose précédente du vaccin ROR ou du vaccin contre la varicelle.
- Les personnes qui sont malades ou qui font de la fièvre (température de 38,5 °C/101,3 °F ou plus).

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après l'administration d'un vaccin pour permettre de surveiller une réaction possible au vaccin. Comme pour tous les vaccins, il existe une faible possibilité qu'une réaction plus grave se produise.

Quels sont les effets secondaires possibles du vaccin RROV?

- Comme pour tout autre vaccin, les effets secondaires les plus courants sont de la douleur, de la rougeur ou de l'enflure au site d'injection.
- Éruption cutanée, fièvre, maux de gorge et de tête pouvant se produire de 7 à 21 jours après l'administration du vaccin.
- Rarement, douleurs ou enflures des testicules.
- Certains enfants peuvent présenter une légère fièvre et une éruption cutanée ressemblant à la varicelle d'une à deux semaines après l'administration du vaccin (l'éruption cutanée doit être couverte si votre enfant peut entrer en contact avec une personne dont le système immunitaire est affaibli).

Les analgésiques (antidouleurs) en vente libre, comme l'ibuprofène (p. ex. Advil) et l'acétaminophène (p. ex. Tylenol), peuvent être utilisés pour soulager les symptômes survenant après la vaccination, dont la fièvre.

Ne donnez pas d'aspirine (AAS) ni aucun produit contenant de l'aspirine. Donner de l'aspirine à des enfants qui ont la varicelle peut provoquer le syndrome de Reye, une maladie potentiellement mortelle qui se caractérise par un gonflement du cerveau et du foie.

Certaines personnes ne doivent pas prendre ces médicaments. Consultez votre prestataire de soins de santé avant d'utiliser l'un ou l'autre de ces médicaments, car ils ne sont pas recommandés à des personnes ayant certains problèmes de santé.

Appelez votre prestataire de soins de santé dans les situations suivantes :

- Fièvre qui dure plus de 24 heures
- Fièvre de 38,5 °C (101,3 °F) ou plus
- Fièvre qui ne baisse pas après avoir pris de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène
- Convulsions
- Apparition d'autres troubles ou symptômes

Questions?

Si vous avez des questions concernant la rougeole, la rubéole, les oreillons, la varicelle ou le vaccin RROV, veuillez communiquer avec le bureau local de la santé publique (voir la liste des bureaux à www.nshealth.ca/public-health-offices) ou avec votre fournisseur de soins de santé.

Pour plus d'information sur l'immunisation, veuillez consulter les sites Web suivants :

Santé Nouvelle-Écosse, Santé publique
https://www.nshealth.ca/immunizations

Immunisation Canada
https://www.immunize.ca/fr

Agence de la santé publique du Canada
https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html/

811 à https://811.novascotia.ca/?lang=fr

www.nshealth.ca/immunizations
(En anglais seulement)

13182/MAY26

santé nouvelle-écosse