

# Шкільна програма імунізації

## ЧОГО ЧЕКАТИ ПІСЛЯ ІМУНІЗАЦІЇ ВІД

- гепатиту В
- вірусу папіломи людини
- менінгококової інфекції
- правця, дифтерії та кашлюку (ацелюлярний компонент)

### ЯКЩО У ВАС Є СУМНІВИ, ЗАПИТАЙТЕ!

Якщо у вас виникли запитання щодо імунізації або якщо ви щось не розумієте, зверніться до місцевого відділу охорони здоров'я. Ви знайдете контактну інформацію у буклеті програми шкільної імунізації.

### ЧИ БУДУТЬ ПІСЛЯ ІМУНІЗАЦІЇ ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ?

Багато людей після імунізації не відчують жодних побічних ефектів.

Найпоширенішими побічними ефектами є почервоніння, набряк або біль у місці введення голки.

Іншими, менш поширеними, побічними ефектами є слабкий головний біль, лихоманка, озноб, діарея, нудота, болі в тілі, зниження енергії та біль або набряк суглобів.

### ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИНИКАЄ РЕАКЦІЯ АБО ЛИХОМАНКА?

Після отримання щеплення учень/учениця перебуватиме під наглядом щонайменше 15 хвилин. Це пов'язано з тим, що існує невелика ймовірність виникнення серйозної алергічної реакції невдовзі після щеплення.

Під час цього 15-хвилинного спостереження медична сестра зможе надати допомогу у разі виникнення будь-якої реакції.

Якщо після вакцинації підвищиться температура, може знадобитися лікування вдома. Переконайтеся, що у вас є ацетамінофен або ібупрофен про всяк випадок.

Лихоманка не обов'язково є поганою, але вона може викликати дискомфорт. Якщо ви думаєте, що в учня температура,

- виміряйте йому температуру
- дайте дитині ацетамінофен або ібупрофен відповідно до інструкції на упаковці, якщо температура перевищує 38,5°C (101,3°F).
- пропонуйте йому пити БІЛЬШЕ РІДИНИ, такої як вода та сік

### ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ СВОЄМУ ЛІКАРЮ АБО 811, ЯКЩО

- лихоманка триває довше 24 годин
- температура 38,5°C (101,3°F) або вище
- лихоманка не спадає протягом 15-45 хвилин після того, як ви дали ацетамінофен або ібупрофен
- учень погано почувається та має інші симптоми