



## SOINS APRÈS LA VACCINATION

## Renseignements importants sur le rotavirus et le vaccin antirotavirus

### ? Qu'est-ce que le rotavirus?

- Le rotavirus est une infection causée par un virus contagieux. Le virus peut survivre sur des surfaces pendant des semaines, même des mois.
- Le rotavirus est une cause fréquente de gastro-entérite (inflammation de la muqueuse de l'estomac et des intestins) chez les enfants. Presque tous les enfants qui n'ont pas reçu le vaccin contre le rotavirus ont l'infection avant l'âge de 5 ans. La gastro-entérite est souvent plus grave chez les enfants de 3 à 24 mois.
- Le rotavirus provoque des vomissements, une diarrhée aqueuse et de la fièvre pouvant durer jusqu'à 7 jours. Ces symptômes peuvent entraîner une déshydratation grave (manque de liquides) chez les bébés et les jeunes enfants.
- Le rotavirus se transmet par contact avec les selles (le caca) d'une personne infectée ou par contact avec des objets contaminés comme des jouets. Il se propage facilement chez les bébés et les jeunes enfants, qui peuvent le transmettre aux membres de leur famille ou aux personnes qui s'occupent d'eux. Il est recommandé de se laver les mains avant et après avoir pris soin de votre bébé, en particulier après les tétées et les changements de couches. Il est très important que les personnes dont le système immunitaire est affaibli se lavent les mains avant et après avoir pris soin d'un bébé.
- Au Canada, environ 36 % des enfants qui ont le rotavirus deviennent tellement malades qu'une consultation médicale est nécessaire, 15 % doivent se rendre aux urgences et 7 % des cas exigent une hospitalisation.

### ? Qu'est-ce que le vaccin antirotavirus?

- Le vaccin antirotavirus est un vaccin oral. Il s'agit d'un liquide administré par la bouche.
- Le vaccin antirotavirus est le meilleur moyen de prévenir cette infection.
- Le vaccin antirotavirus peut être administré en même temps que d'autres vaccins infantiles. Il doit toutefois être administré en premier, car il contient du saccharose (sucre) qui peut aider à réduire la douleur causée par les autres vaccins administrés en même temps.
- Le vaccin antirotavirus contient une petite quantité du virus affaibli qui a été spécifiquement traité pour ne

pas rendre malades les personnes en bonne santé. Ce virus affaibli peut être présent dans les selles (le caca) jusqu'à 10 jours après l'administration du vaccin.

- Le vaccin antirotavirus est efficace à environ 85% à 98% pour prévenir la diarrhée sévère causée par le rotavirus.
- Si votre bébé ne reçoit pas une dose complète du vaccin (p. ex. s'il recrache le produit ou vomit), une deuxième dose ne sera pas administrée.
- Le vaccin doit être administré sous la supervision d'un fournisseur de soins de santé dans une clinique ou un cabinet médical.

### ? Qui devrait recevoir le vaccin antirotavirus?

- Le Programme de vaccination pour les enfants, les jeunes et les adultes de la Nouvelle-Écosse recommande que les enfants reçoivent une dose du vaccin antirotavirus à l'âge de 2, 4 et 6 mois.
- Les 3 doses du vaccin antirotavirus doivent être administrées avant l'âge de 8 mois.
- Le vaccin antirotavirus peut être administré aux :
  - » Bébé allaités au sein ou nourris avec de la préparation pour nourrissons
  - » Bébé vivant dans un foyer où une personne est enceinte
  - » Bébé prématurés en bonne santé selon leur date de naissance réelle

### ? Qui NE devrait PAS recevoir le vaccin antirotavirus?

- Les bébés âgés de moins de 6 semaines.
- Les bébés qui ont eu une réaction allergique grave à une dose précédente ou à toute composante du vaccin antirotavirus ou de son contenant.
- Les bébés qui ont de la fièvre (température de 38,5 °C/101,3 °F ou plus) ou de la diarrhée et/ou des vomissements modérés à sévères.
- Les bébés qui pourraient avoir des problèmes immunitaires. Consultez un fournisseur de soins de santé avant que votre bébé reçoive le vaccin antirotavirus.
- Les bébés qui ont une invagination (obstruction de l'intestin) ou un trouble pouvant causer une invagination.

*Veuillez lire l'information au verso.*

**[www.nshealth.ca/immunizations](http://www.nshealth.ca/immunizations)**

(En anglais seulement) 13197/MAY26





## SOINS APRÈS LA VACCINATION

## Renseignements importants sur le rotavirus et le vaccin antirotavirus

Ce vaccin est important pour protéger votre enfant contre le rotavirus. Votre bébé peut manger et boire normalement, y compris du lait maternel, avant et après le vaccin.

**Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après l'administration d'un vaccin pour permettre de surveiller une réaction possible au vaccin. Comme pour tous les vaccins, il existe une faible possibilité qu'une réaction plus grave se produise.**



### Quels sont les effets secondaires possibles du vaccin antirotavirus?

Voici des effets secondaires courants :

- Diarrhée
- Vomissements
- Fièvre
- Écoulement nasal
- Maux de gorge
- Toux ou respiration sifflante
- Otites

**Étant donné que votre enfant pourrait faire de la fièvre, assurez-vous d'avoir de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène à la maison. Suivez les instructions fournies avec le produit. Ces médicaments ne doivent pas être pris si votre enfant souffre de certains problèmes médicaux. Parlez à votre fournisseur de soins de santé des antécédents médicaux de votre enfant avant d'utiliser l'un ou l'autre de ces médicaments.**

### Appelez votre fournisseur de soins de santé dans les cas suivants:

- Votre bébé a de la fièvre depuis plus de 24 heures.
- La température de votre bébé est de 38,5 °C/101,3 °F ou plus.
- Sa fièvre ne baisse pas après la prise d'acétaminophène ou d'ibuprofène.
- Votre bébé a des convulsions.
- Votre bébé a très mal au ventre, du sang dans les selles (caca), le ventre gonflé, des vomissements ou une diarrhée sévère.



### Questions?

Si vous avez des questions sur le rotavirus ou le vaccin antirotavirus, veuillez communiquer avec le bureau local de la santé publique (voir la liste des bureaux à [www.nshealth.ca/public-health](http://www.nshealth.ca/public-health) — en anglais seulement) ou avec votre fournisseur de soins de santé.

Pour plus d'information sur la vaccination, veuillez consulter les sites Web suivants:

**Santé Nouvelle-Écosse Santé publique**  
[www.nshealth.ca/immunizations](http://www.nshealth.ca/immunizations)  
(en anglais seulement)

**Immunisation Canada**  
[immunize.ca/fr](http://immunize.ca/fr)

**Agence de la santé publique du Canada**  
[www.canada.ca/fr/sante-publique](http://www.canada.ca/fr/sante-publique)

**Société canadienne de pédiatrie**  
[cps.ca/fr](http://cps.ca/fr)

**811**

[811.novascotia.ca/?lang=fr](http://811.novascotia.ca/?lang=fr)

[www.nshealth.ca/immunizations](http://www.nshealth.ca/immunizations)

(En anglais seulement) 13197/MAY26

