INFORMATION SUR LE VACCINATION

Le vaccin contre le méningocoque de sérogroupe B (MenB)

Qu'est-ce que l'infection à méningocoque de sérogroupe B (MenB)?

- L'infection à méningocoque du sérogroupe B est causée par une bactérie (Neisseria meningitidis) appelée méningocoque.
- De nombreuses personnes sont porteuses de cette bactérie à l'arrière de la gorge ou dans le nez sans se sentir malades ni présenter de symptômes.
- Ces bactéries parviennent parfois à contourner les défenses naturelles de l'organisme et provoquent des maladies graves, comme la méningite (infection de la membrane qui entoure le cerveau) et la méningococcémie (infection généralisée touchant le sang et plusieurs organes). Si l'une de ces maladies survient, on parle alors d'infection invasive à méningocoque, qui constitue un danger de mort.
- Le sérogroupe B est l'une des nombreuses souches de ces bactéries responsables de l'infection à méningocoque.
- Certaines personnes atteintes d'une infection à méningocoque du sérogroupe B peuvent subir des lésions aux reins, des amputations ou des pertes auditives.
- L'infection à méningocoque du sérogroupe B peut être prévenue par la vaccination.

Qu'est-ce que le vaccin contre le méningocoque de sérogroupe B?

- Le vaccin contre le méningocoque de sérogroupe B peut aider à prévenir les maladies causées par la souche B du méningocoque.
- Il ne protège pas contre les autres souches de cette bactérie ni contre d'autres organismes responsables de la méningite ou de la septicémie.
- Le vaccin est administré par injection. Il ne peut pas provoquer une infection à méningocoque, car il ne contient pas de bactéries vivantes.
- Pour être complètement protégée, une personne a besoin de deux doses du vaccin contre le méningocoque du groupe B. La deuxième dose est administrée au moins quatre semaines après la première.

Qui devrait recevoir le vaccin contre le méningocoque de sérogroupe B?

- Les personnes qui peuvent être exposées à la bactérie méningocoque et celles qui présentent un risque élevé de contracter une infection à méningocoque devraient envisager de recevoir ce vaccin.
- Le vaccin contre le méningocoque du groupe B ne fait pas partie du Programme de vaccination pour les enfants, les jeunes et les adultes de la Nouvelle-Écosse. Toutefois, il devrait être envisagé pour les personnes de moins de 26 ans qui, pour la première fois :
  - » vivent ou vivront dans des lieux collectifs comme des résidences, des dortoirs ou des refuges pour jeunes à long terme;
  - » vivront dans des casernes militaires de la Nouvelle-Écosse à titre de recrues;
  - » vivent dans des lieux dotés d'espaces partagés comme des dortoirs et des salles de bain et cuisines communes.

Qui NE devrait PAS recevoir le vaccin contre le méningocoque de sérogroupe B?

- Les personnes qui ont déjà eu une réaction allergique grave à une dose précédente ou à l'une des composantes du vaccin contre le méningocoque de sérogroupe B.
- Les personnes malades ou qui font de la fièvre (température de 38,5 °C/101,3 °F ou plus).

Veuillez lire l'information au verso.

www.nshealth.ca/immunizations
(En anglais seulement) 13201/MAY26

santé nouvelle-écosse

SOINS APRÈS LA VACCINATION

Le vaccin contre le méningocoque de sérogroupe B (MenB)

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après l'administration d'un vaccin pour permettre de surveiller une réaction possible au vaccin. Comme pour tous les vaccins, il existe une faible possibilité qu'une réaction plus grave se produise.

Quels sont les effets secondaires possibles du vaccin contre le méningocoque de sérogroupe B?

Comme pour tout autre vaccin, les effets secondaires les plus courants sont de la douleur, de la rougeur et de l'enflure au site d'injection, de la fatigue et de la fièvre.

Il est possible de faire de la fièvre après la vaccination. Veuillez donc vous assurer d'avoir de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène à la maison. Suivez les instructions figurant sur l'emballage. Consultez votre prestataire de soins de santé avant d'utiliser l'un ou l'autre de ces médicaments, car ils ne sont pas recommandés pour les personnes ayant certains problèmes de santé.

Appelez votre prestataire de soins de santé dans les situations suivantes :

- Fièvre qui dure plus de 24 heures
- Fièvre de 38,5 °C (101,3 °F) ou plus
- Fièvre qui ne baisse pas après avoir pris de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène
- Apparition d'autres troubles ou symptômes

Questions?

Si vous avez des questions sur l'infection à méningocoque de sérogroupe B et le vaccin contre le méningocoque de sérogroupe B, veuillez communiquer avec le bureau local de la santé publique (voir la liste des bureaux à www.nshealth.ca/public-health-offices) ou avec votre fournisseur de soins de santé.

Pour plus d'information sur l'immunisation, veuillez consulter les sites Web suivants :

Santé Nouvelle-Écosse, Santé publique
https://www.nshealth.ca/immunizations

Immunisation Canada
https://www.immunize.ca/fr

Agence de la santé publique du Canada
https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html/

811 à https://811.novascotia.ca/?lang=fr

www.nshealth.ca/immunizations
(En anglais seulement)

13201/MAY26

santé nouvelle-écosse