INFORMATION SUR LE VACCINATION

Le vaccin quadrivalent conjugué contre le méningocoque (Men-C-ACYW)

Qu'est-ce que l'infection à méningocoque?

- L'infection à méningocoque est causée par une bactérie (Neisseria meningitidis) appelée méningocoque.
- De nombreuses personnes sont porteuses de cette bactérie à l'arrière de la gorge ou dans le nez sans se sentir malades ni présenter de symptômes.
- Ces bactéries parviennent parfois à contourner les défenses naturelles de l'organisme et provoquent des maladies graves, comme la méningite (infection de la membrane qui entoure le cerveau) et la méningococcémie (infection généralisée touchant le sang et plusieurs organes). Si l'une de ces maladies survient, on parle alors d'infection invasive à méningocoque, qui constitue un danger de mort.
- Plusieurs souches de ces bactéries peuvent causer l'infection à méningocoque.
- Certaines personnes atteintes d'une infection à méningocoque peuvent subir des lésions aux reins, des amputations ou des pertes auditives.
- L'infection à méningocoque peut être prévenue par la vaccination.

Qu'est-ce que le vaccin quadrivalent conjugué contre le méningocoque (Men-C-ACYW)?

- Le vaccin Men-C-ACYW assure une protection contre les maladies causées par les souches de méningocoques des groupes A, C, Y et W-135.
- Il ne protège pas contre d'autres souches de cette bactérie ni contre d'autres organismes responsables de la méningite ou de la septicémie.
- Le vaccin est administré par injection. Il ne peut pas provoquer une infection à méningocoque, car il ne contient pas de bactéries vivantes.

Qui devrait recevoir le vaccin quadrivalent conjugué contre le méningocoque (Men-C-ACYW)?

- En Nouvelle-Écosse, le vaccin contre le vaccin Men-C-ACYW est systématiquement proposé aux élèves de 7e année dans le cadre du programme de vaccination scolaire. Si le vaccin n'a pas été administré ou a été refusé dans le cadre du programme de vaccination scolaire de 7e année, il est toujours possible de se faire vacciner gratuitement dans le cadre de ce programme jusqu'à l'âge de 19 ans.
- Les personnes susceptibles d'être exposées à la bactérie méningocoque et celles qui présentent un risque élevé de contracter une infection à méningocoque devraient envisager de recevoir ce vaccin.

Qui NE devrait PAS recevoir le vaccin quadrivalent conjugué contre le méningocoque (Men-C-ACYW)?

- Les personnes qui ont déjà eu une réaction allergique grave à une dose précédente ou à l'une des composantes du vaccin Men-C-ACYW.
- Les personnes malades ou qui font de la fièvre (température de 38,5 °C/101,3 °F ou plus).

Veuillez lire l'information au verso.

www.nshealth.ca/immunizations
(En anglais seulement)

13203/MAY26

santé nouvelle-écosse

SOINS APRÈS LA VACCINATION

Le vaccin quadrivalent conjugué contre le méningocoque (Men-C-ACYW)

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après l'administration d'un vaccin pour permettre de surveiller une réaction possible au vaccin. Comme pour tous les vaccins, il existe une faible possibilité qu'une réaction plus grave se produise.

Quels sont les effets secondaires possibles du vaccin quadrivalent conjugué contre le méningocoque (Men-C-ACYW)?

Comme pour tout autre vaccin, les effets secondaires les plus courants sont de la douleur, de la rougeur et de l'enflure au site d'injection, de la fatigue et de la fièvre.

Il est possible de faire de la fièvre après la vaccination. Veuillez donc vous assurer d'avoir de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène à la maison. Suivez les instructions figurant sur l'emballage. Consultez votre prestataire de soins de santé avant d'utiliser l'un ou l'autre de ces médicaments, car ils ne sont pas recommandés pour les personnes ayant certains problèmes de santé.

Appelez votre prestataire de soins de santé dans les situations suivantes :

- Fièvre qui dure plus de 24 heures
- Fièvre de 38,5 °C (101,3 °F) ou plus
- Fièvre qui ne baisse pas après avoir pris de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène
- Apparition d'autres troubles ou symptômes

Questions?

Si vous avez des questions sur l'infection à méningocoque et le vaccin quadrivalent conjugué contre le méningocoque (Men-C-ACYW), veuillez communiquer avec le bureau local de la santé publique (voir la liste des bureaux à www.nshealth.ca/public-health-offices) ou avec votre fournisseur de soins de santé.

Pour plus d'information sur l'immunisation, veuillez consulter les sites Web suivants :

Santé Nouvelle-Écosse, Santé publique
https://www.nshealth.ca/immunizations

Immunisation Canada
https://www.immunize.ca/fr

Agence de la santé publique du Canada
https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html

811 à https://811.novascotia.ca/?lang=fr

www.nshealth.ca/immunizations
(En anglais seulement)

13203/MAY26

santé nouvelle-écosse