

# Renseignements importants au sujet de la **polio** et le **vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI)**

## À LIRE ATTENTIVEMENT

### Qu'est-ce que la polio?

- La polio est une maladie virale qui peut entraîner une invalidité permanente ou une paralysie.
- La paralysie peut toucher les muscles nécessaires à la respiration.
- La polio a été éradiquée au Canada grâce à la vaccination.

- Les personnes malades ou qui ont de la fièvre (température de 38,5 °C/101,3 °F ou plus).

*Les gens doivent rester à la clinique pendant au moins 15 minutes après avoir reçu tout type de vaccin afin de surveiller une possible réaction. Comme pour tout vaccin, il existe une faible possibilité qu'une réaction plus grave se produise.*

### Qu'est-ce que le VPI?

- Le VPI est un vaccin inactivé unique qui protège contre la polio.
- La vaccination est le meilleur moyen de prévenir la polio.
- Le vaccin est administré par injection.

### Quels sont les effets secondaires possibles du VPI?

- Les effets secondaires graves liés au VPI sont extrêmement rares. Les effets secondaires de ce vaccin sont généralement légers et ne durent que quelques jours après l'administration du vaccin.
- Certaines personnes peuvent présenter de la douleur, de l'enflure et de la rougeur au site d'injection.
- Certaines personnes peuvent avoir de la fièvre après avoir reçu le VPI.
- Si vous présentez un symptôme gênant ou un effet secondaire qui n'est pas mentionné ici ou qui s'aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, contactez votre fournisseur de soins de santé.

*Les médicaments antidouleur (analgésiques) en vente libre comme l'ibuprofène (p. ex. Advil) et l'acétaminophène (p. ex. Tylenol) peuvent être utilisés pour soulager les symptômes après la vaccination, y compris la fièvre. Certaines personnes ne devraient pas prendre ces médicaments. Consultez votre fournisseur de soins de santé ou votre pharmacien·ne si vous avez des questions ou si vous ne savez pas si vous pouvez prendre ces médicaments.*

### Communiquez avec votre fournisseur de soins de santé dans les cas suivants :

- Vous avez une fièvre de 38,5 °C (101,3 °F) ou plus, ou la fièvre dure plus de 24 heures.
- Votre fièvre ne baisse pas après avoir pris de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène.
- Vous présentez d'autres symptômes.

### Questions?

Si vous avez des questions au sujet de la polio ou du VPI, veuillez communiquer avec votre bureau de santé publique local (voir la liste des bureaux à [www.nshealth.ca/public-health-offices](http://www.nshealth.ca/public-health-offices) – en anglais seulement) ou avec votre fournisseur de soins de santé.

Pour plus d'information sur la vaccination, veuillez consulter les sites Web suivants :

- Santé Nouvelle-Écosse, Santé publique : <https://www.nshealth.ca/public-health/immunizations> (en anglais seulement)
- Immunisation Canada : <https://immunize.ca/fr>
- Agence de la santé publique du Canada : <https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html>
- 811 : <https://811.novascotia.ca/?lang=fr>

## ATTENTION

### Qui ne devrait PAS recevoir le VPI?

- Les personnes qui ont déjà eu une réaction allergique grave à une dose précédente ou à l'une des composantes du VPI.