INFORMATION SUR LE VACCINATION

Le vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI)

Qu'est-ce que la polio?

- La polio est une maladie causée par un virus. Elle peut entraîner une paralysie, une incapacité de longue durée ou la mort.
- La paralysie peut toucher les muscles nécessaires à la respiration.
- La polio a été éradiquée au Canada grâce à la vaccination.

Qu'est-ce que le VPI?

- Le VPI est un vaccin inactivé unique qui protège contre la polio.
- La vaccination est le meilleur moyen de prévenir la polio.
- Le vaccin est administré par injection.

Qui devrait recevoir le VPI?

- Les enfants et les ados à jour dans leur vaccination contre le tétanos, mais qui n'ont pas reçu au moins 3 doses d'un VPI (c.-à-d. DCaT-VPI-Hib ou dcaT-VPI).
- Les adultes à jour dans leur vaccination contre le tétanos, mais qui présentent un risque élevé de contracter la polio, notamment les personnes voyageant dans des zones endémiques (endroits où une certaine maladie est courante).

Remarque – Le VPI est généralement administré dans le cadre de vaccins combinés. Le VPI seul ne doit être administré qu'aux adultes présentant un risque élevé de polio ou aux enfants qui n'ont pas besoin de doses supplémentaires de vaccin antitétanique.

Qui NE devrait PAS recevoir le VPI?

- Les personnes qui ont déjà eu une réaction allergique grave à une dose précédente ou à l'une des composantes du VPI.
- Les personnes malades ou qui ont de la fièvre (température de 38,5 °C/101,3 °F ou plus).

Veuillez lire l'information au verso.

www.nshealth.ca/immunizations

(En anglais seulement) 13211/MAY26

santé nouvelle-écosse

SOINS APRÈS LA VACCINATION

Le vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI)

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après l'administration d'un vaccin pour permettre de surveiller une réaction possible au vaccin. Comme pour tous les vaccins, il existe une faible possibilité qu'une réaction plus grave se produise.

Quels sont les effets secondaires possibles du VPI?

- Comme pour tout autre vaccin, les effets secondaires les plus courants sont de la douleur, de la rougeur ou de l'enflure au site d'injection.

Il est possible de faire de la fièvre après la vaccination. Veuillez donc vous assurer d'avoir de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène à la maison. Suivez les instructions figurant sur l'emballage. Consultez votre prestataire de soins de santé avant d'utiliser l'un ou l'autre de ces médicaments, car ils ne sont pas recommandés pour les personnes ayant certains problèmes de santé.

Appelez votre prestataire de soins de santé dans les situations suivantes :

- Fièvre qui dure plus de 24 heures
- Fièvre de 38,5 °C (101,3 °F) ou plus
- Fièvre qui ne baisse pas après avoir pris de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène
- Apparition d'autres troubles ou symptômes

Questions?

Si vous avez des questions au sujet de la polio ou du VPI, veuillez communiquer avec votre bureau de santé publique local (voir la liste des bureaux à www.nshealth.ca/public-health — en anglais seulement) ou avec votre fournisseur de soins de santé.

Pour plus d'information sur la vaccination, veuillez consulter les sites Web suivants :

Santé Nouvelle-Écosse Santé publique
www.nshealth.ca/immunizations *(en anglais seulement)*

Immunisation Canada
immunize.ca/fr

Agence de la santé publique du Canada
www.canada.ca/fr/sante-publique

Société canadienne de pédiatrie
cps.ca/fr

811
811.novascotia.ca/?lang=fr