

Patient & Family Guide

2025

فحص تشخيص السكري بعد انتهاء فترة الحمل

برنامج رعاية مرضى السكري في نوفا سكوشا

Also available in English: WK85-2300
Screening for Diabetes After Pregnancy



فحص تشخيص السكري بعد انتهاء فترة الحمل

هل يفترض في إجراء فحص تشخيصي للسكري بعد الحمل؟

أجل، يجب إجراء الفحص التشخيصي في حال:

- كنت تعانين من **السكري الحملي** (السكري الذي يتم تشخيصه خلال فترة الحمل)؛
أو
- كشفت نتائج الفحوصات التي أجريتها خلال الحمل عن إمكانية إصابتك **بالسكري الخفي** (السكري غير المشخص قبل الحمل).

ما هو أفضل وقت لإجراء الفحص التشخيصي؟

- يجب إجراء فحص تشخيص السكري في أي وقت، ما بين 6 أسابيع و6 أشهر بعد ولادة طفلك.
- يجب إجراء الفحص في وقت مبكر (ما بين 6 و8 أسابيع بعد ولادة طفلك) في حال كشفت نتائج الفحوصات التي أجريتها أثناء الولادة عن إمكانية إصابتك بالسكري غير المشخص.

ما هي فائدة الفحص التشخيصي؟

- في حال كنت مصابة بالسكري الحملي، ستكونين عرضة، أو من الممكن أن تكوني مصابة بالسكري من النمط الثاني. أظهرت الفحوصات التي تُجرى بعد انتهاء فترة الحمل أنه من بين كل 3 نساء يعاني من السكري الحملي امرأة 1 مصابة بالسكري، أو بارتفاع في مستويات السكر في الدم بشكل أعلى من المعدل الطبيعي.

- في حال كنت مصابة بالسكري ولا تدرkin ذلك، ستكونين عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات السكري. يشمل ذلك تغيرات في العينين (النظر)، العدوى المهبلي أو التهابات الجهاز البولي، فضلاً عن مشاكل في الكلية والقلب قد تتفاقم مع مرور الوقت.
- إن الإصابة بالسكري تعني أنك أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية في حال الحمل من جديد. فتشخيص السكري في وقت مبكر ومعاجنته من شأنه أن يقلل من تلك المخاطر.

ماذا يمكن أن يحصل في حال لم أشاً إجراء الفحص التشخيصي؟

- الخيار لك. من البديهي أن تشعري بالخوف. عليك أن تكوني على بينة من جسمك لتتمكنين من اتخاذ القرارات الملائمة. من المهم أن تعرفي ما إذا كنت مصابة بالسكري لتتمكنين من معاجنته وتقليل خطر الإصابة بمضاعفاته.

ما هي الفحوصات التشخيصية المطلوبة بعد انتهاء فترة الحمل؟

- يُطلب من معظم النساء إجراء اختبار تحمل 75 غرام من الجلوكوز عن طريق الفم، بحيث ينبغي عليك شرب سائل محلى في المختبر. تؤخذ عينة من دمك قبل شرب السائل ومن ثم بعد ساعتين من الانتهاء من شربه.
- في حال كان مزود الرعاية الصحية يشك في إصابتك بالسكري غير المشخص، ستختضعين لتحليل سكر الدم اللازمي الصائم.
- وفي كلتا الفحوصين، عليك الالتزام بالصيام (عدم تناول المأكولات والمشروبات قبل 8 إلى 10 ساعات) قبل الخضوع للاختبار.

- لا يترب عن هذين الفحصين أي مخاطر عليك.

ما مدى أهمية هذين الفحصين؟

- يظهر هذان الاختباران مدى تحمل جسمك للجلوكوز (السكر) خاصة بعد زوال هرمونات الحمل.

كيف يتم ترتيب مواعيد لإجراء فحوصات الدم؟

- سيتم تزويشك بطلب (استمارة تستخدم في المختبر) لتمكنك من ترتيب موعد للفحص التشخيصي بنفسك.
- يمكن لعيادة طبيك المعالج أن تحيز لك موعداً تبعاً لتوقيت الفحص.
- يتم إجراء الفحوصات التشخيصية في مختبر لجمع عينات الدم. راجعي المختبر المحلي لأن اختبار تحمل الجلوكوز غير متوفّر في كافة المختبرات.
- يمكن حجز موعد عبر الأنترنت أو عبر الهاتف.

كيف يمكنني أن أتذكر وأجد الوقت المناسب لإجراء الفحص التشخيصي؟

- ضعي الخطط مسبقاً. من المهم الخضوع للفحوصات ما بين 6 أسابيع و 6 أشهر بعد ولادة طفلك.
- احجزي موعداً لإجراء الفحص في الأسبوع نفسه الذي ستراجعين فيه الطبيب. بهذه الطريقة، لن تنسى أبداً. من الممكن إجراء ذلك قبل أيام قليلة من موعد المراجعة الروتينية للطبيب بعد 6 أسابيع من ولادة طفلك.
- أطلبي من أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء الاهتمام بطفلك.

كيف يمكنني الاستعداد لاختبار تحمل 75 غرام من الجلوكوز عن طريق الفم؟ خلال الأيام القليلة التي تسبق الاختبار:

- لا تغيري عاداتك الغذائية (ما تأكلينه ومواعيد تناول الطعام) لأن ذلك من شأنه تغيير نتائج الاختبار.
- في حال كنت مصابة بالزكام، أو الأنفلونزا أو أي مرض آخر، من الأفضل تغيير الموعد. حاولي أن تحجزي موعدًا آخر بعد بضعة أيام فقط.

نحن هنا لمساعدتك!

ما هي أسئلتك؟ لا تتردد في بطرحها
في نوفا سكوشيا، يمكنك الاتصال على الرقم 811
للتحدث مع ممرضة مجازة حول أسئلتك الطبية على مدار الساعة 24/7

في اليوم المحدد لإجراء اختبار تحمل 75 غرام من الجلوكوز

- قبل 8 ساعات من الاختبار:
 - امتنعي عن الأكل، الشرب، التدخين، أو ممارسة التمارين. يمكنك الاكتفاء بشرب كميات صغيرة من الماء.
 - أمامك 5 دقائق لشرب السائل المحلي.
 - قد يستغرق الاختبار ما يصل إلى 3 ساعات.
 - خلال الاختبار، سُيُطلب منك ما يلي:
 - الجلوس بهدوء طوال مدة الاختبار لأن الحركة من شأنها أن تغير النتائج.
 - عدم مغادرة منطقة المختبر خلال الاختبار.
 - عدم الأكل خلال الاختبار. يمكنك إحضار وجبة خفيفة لتناولها بعد الاختبار.
- تؤخذ عينة من الدم قبل شرب السائل لتحديد معدل الجلوكوز في دمك على الريق. من الممكن ألا تضطري إلى شرب السائل لأن ذلك يتوقف على قيمة هذا المعدل.
- تؤخذ عينة من الدم بعد مرور ساعتين على شرب السائل المحلي. تذكرى بأنه لا يمكن للعاملين المعنيين بجمع عينات الدم تزويدك بنتيجة الاختبار. سوف يستعرض مزود الرعاية الصحية الأولية النتائج معك.

ماذا سيحصل في حال تبين أنني مصابة بالسكري؟

- سيوفر فريق خدمات الرعاية الصحية لمرض السكري المساعدة لك ولعائلتك لوضع خطة تتلاءم مع حالتك الصحية.

أنا أم مرضعة. هل يمكنني إجراء الاختبار؟

أجل. يمكنك إجراء الاختبار، حتى لو كنت أمّا مرضعة. من الممكن أن تحتاجي إلى فحص آخر، بحسب نتيجة اختبار تحمل الجلوكوز، بعد الفطم (التوقف عن رضاعة طفلك).

ما هي الخطوات التي يمكنني اتخاذها للوقاية من السكري أو علاجه؟

- حاوي التخلص من الوزن الذي كسبته خلال فترة الحمل ببطء.
- اختياري الأطعمة الصحية. وتناولي طعامك في أوقات منتظمة خلال النهار.
- كوني نشطة. احرصي على ممارسة رياضة المشي مع طفلك بشكل منتظم.
- حاوي أن تنامي جيداً. وخذلي قسطاً من الراحة أثناء فترة نوم طفلك.

ماذا لو جاء الفحص التشخيصي بعد انتهاء فترة الحمل طبيعي؟

- في حال إصابتك بالسكري الحملـي، ستكونين عرضة للإصابة به ثانية في حال الحمل من جديد في المستقبل.
- اخضعي لفحص السكري التشخيصي قبل الحمل مرة أخرى.
- يجب إجراء الفحص التشخيصي للسكري كل 1 إلى 3 سنوات.

إن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة مخصصة لأهداف تطبيقية فقط. هذه المعلومات ليست معدّة لتكون أو تقوم مقام الرعاية الصحية أو المشورة الطبية. قد لا تتطابق هذه المعلومات على جميع الحالات. إذا كانت لديك أي أسئلة، الرجاء الاتصال بمزود الرعاية الصحية الخاص بك.

يمكنك العثور على هذا الدليل وكافة موارد المرضى التي نوفرها على الموقع التالي:

<https://library.nshealth.ca/Patients-Guides>

(متوفّر فقط باللغة الإنجليزية)

تواصل مع ممرضة مجازة بنوفا سكوشا في أي وقت، عبر الاتصال على الرقم 811 أو زيارة

<https://811.novascotia.ca>

(متوفّر فقط باللغة الإنجليزية)

من إعداد:

برنامج رعاية مرضى السكري في نوفا سكوشا

من تصميم: خدمات مكتبة هيئة الصحة بنوفا سكوشا

AR85-2370 © November 2025 Nova Scotia Health Authority

To be reviewed November 2028 or sooner, if needed.

Learn more: <https://library.nshealth.ca/patient-education-resources>

