

超声内镜检查 (Endoscopic Ultrasound)

伊丽莎白二世医疗科学中心 (QE II)
维多利亚综合医院 (Victoria General,
VG) 院区

在此网站可找到本小册子以及所有患者资源：

<https://www.nshealth.ca/patient-education-resources?language=Simplified%20Chinese>

与一位新斯科舍省的注册护士交流，拨打811或访问
<https://811.novascotia.ca>

编制单位：伊丽莎白二世医疗科学中心 (QE II)
胃肠病科 (Gastroenterology)

插图来源：LifeART超级解剖1图像，版权所有 © 1994年，
美国TechPool Studios Corp.

设计：图书馆事务

CH85-2429 © June 2026 Nova Scotia Health Authority
To be reviewed June 2029 or sooner, if needed.

Learn more:

<https://library.nshealth.ca/patient-education-resources>

请于预约时间前 **1 小时** 到达。

- 请在 **Dickson** 大楼（正门）或 **Centennial** 大楼（正门）一楼的自助报到机（kiosk）办理登记。

Also available in English: WI85-1482
Endoscopic Ultrasound - Victoria
General (VG) Site, QE II




www.nshealth.ca

注
备

[illegible]

检查后24小时内:

- > 请勿驾驶汽车或操作重型机械（如割草机、拖拉机或叉车）。
- > 请勿饮酒。
- > 请勿照顾他人或协助照顾他人（如幼儿或年长家庭成员）。
- > 请勿签署任何法律文件或重要文件（如贷款合同、抵押合同或遗嘱）。



这项检查有哪些风险？

- 检查过程中使用的药物可能会引起心脏和/或肺部并发症（如心跳过快、过慢或心悸，或呼吸困难）。
- 发生出血或消化道穿孔的风险低于1%。如果发生这种情况，您可能需要接受手术治疗。


如果医生从您的胰腺采集了组织活检样本，发生出血、感染和/或急性（严重）胰腺炎（胰腺肿胀）的风险约为1%至2%。

- 如果您对这些风险有任何疑问或顾虑，请咨询您的医生。

超声内镜检查（Endoscopic Ultrasound）

什么是超声内镜检查？

- 超声内镜检查可用于检查您的：
 - > 上消化道（见第2页）
 - > 胰腺
 - > 胆囊
 - > 胆管
 - > 纵隔（胸腔中间的结构）
 - > 直肠（肛门）（需要时）
- 您的上消化道包括：
 - > 食道（连接口腔和胃 [腹部] 的管道）
 - > 胃
 - > 十二指肠（小肠的第一部分）
- 您的医生通常会重点检查他们认为存在问题的某一个区域。



- 本检查使用内窥镜进行。内窥镜是一根柔软的管子，末端装有照明灯和探头（小型超声装置）。



- 探头发出的声波会从医生正在观察的器官上反射回来。这些声波形成黑白图像。如有需要，医生可能会使用穿刺针采集组织样本（称为活检）。

- 当管子经过喉咙时，你可能会感觉想要呕吐。您仍然可以正常呼吸。
- 当导管到达检查部位后，探头会发出声波，对您的器官进行成像。
- 检查通常需要 **20 至 45 分钟**。

检查后会发生什么？

- 您将被带到恢复区域，直到镇静药物的作用消退。
- 如果医生为您进行了活检，您需要留在恢复区域至少 **60 分钟（1 小时）**。
- 检查后，您感到饱胀或需要排气是正常的。
- 您的排便习惯可能会发生变化，例如大便变软。
- **您必须由一位负责的成年人送您回家。**
 - > 请勿步行回家。如有一位负责的成年人陪同，您可以乘坐出租车或公交车回家。

我去哪里接受检查？

您必须先**在 Dickson 大楼（正门）或 Centennial 大楼（正门）一楼的自助报到机办理登记。**

- 然后，前往**维多利亚综合医院（Victoria General, VG）院区的维多利亚大楼（Victoria Building）的9楼。**在登记台办理登记手续。
- 确保您在接受检查前有充足的时间停车。医院停车位有限。

如何进行检查？

- 我们会在您的手臂或手部置入**静脉导管（I.V.）**。我们会通过**静脉导管**为您注射药物，帮助您放松和缓解疼痛。
- 我们可能会在您的咽喉喷洒**麻醉喷雾**，或请您用一种能使**喉咙麻木的液体漱口**。这样做有助于导管顺利插入，同时避免让你产生**呕吐感**。
- 医生会将一根**柔软的导管**从您的**口腔和胃部**插入小肠的第一部分，或插入**直肠**。

我应该如何准备接受超声内镜检查？

检查前

检查过程中，您将接受**镇静剂**（帮助您放松的药物）。

- 您必须有一位**负责的成年人**：
 - > 在您接受检查期间留在医院
 - > 检查结束后送您回家。如有一位**负责的成年人**陪同，您可以乘坐出租车或公交车回家。
 - > **陪伴您过夜**
- 如果无法做到，请在检查前联系您的**专科医生**。我们可能需要取消您的检查。
- 如果您正在服用**血液稀释药物**，请在预约检查时告知**预约登记人员**。

检查当天

- 检查前 **8 小时**内，
请勿进食或饮用任何饮品。
- 如果您的检查安排在上午，
请在检查前一晚午夜后不再进食或饮水。



如果您接受的是直肠超声内镜检查：

- 在检查前，您可以照常进食和饮水。
- 来院检查前，您必须在家使用 **2 支 Fleet® 灌肠剂**。灌肠剂是一种注入直肠的液体，可帮助排空粪便并清洁肠道。
 - > 第一支灌肠剂请于检查前一天晚上（晚餐后）使用。
 - > 第二支灌肠剂请于预约时间前 **2 小时**使用。

- 请携带一份您正在使用的所有药物清单到医院，包括处方药、非处方药、吸入剂、药膏、滴眼液、贴剂、草药制品、维生素及膳食补充剂。

- 请告知您的医疗护理团队您是否有任何过敏情况。
- 检查后，您可能需要服用抗生素以预防感染。如有需要，你的医生会开具该药物的处方。

如果您需要取消预约：

- > 请拨打 **902-473-6666**，并根据语音提示选择留言。
- > 这样我们就能将您的时段安排给其他患者。

- 请勿佩戴任何首饰，也不要携带贵重物品到医院。医院对任何物品的丢失概不负责。
- 请勿使用有香味的产品（如香水或护发产品）。新斯科舍省卫生局（Nova Scotia Health）实行无香环境。