

- › Si vous prenez des pilules contraceptives, continuez à les prendre comme d'habitude tout en utilisant une méthode contraceptive additionnelle.

Voici des méthodes contraceptives additionnelles possibles :

- Condom masculin
- Condom féminin
- Diaphragme (dispositif qui bloque le col de l'utérus)
- Cape cervicale
- Éponge contraceptive
- Abstinence (pas de rapports sexuels)

Ce dépliant est uniquement conçu à des fins éducatives. Il ne remplace pas les conseils ou le jugement des professionnels de la santé. L'information peut ne pas s'appliquer à toutes les situations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à votre prestataire de soins de santé.

Préparation : Service d'anesthésie, secteur du centre
Conception et gestion : Services de la bibliothèque de Santé Nouvelle-Écosse

FF85-2202 © Juin 2025 Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse
L'information contenue dans cette publication doit être révisée en juin 2028 ou avant, au besoin.

Pour en savoir plus : <https://library.nshealth.ca/patient-education-resources>

Interaction des contraceptifs avec les médicaments – sugammadex et/ou aprépitant

Also available in English: WP85-2076
*Birth Control Medication Interactions -
Sugammadex and/or Aprepitant*

Interaction des contraceptifs avec les médicaments

Votre opération a eu lieu le : _____ (date)

L'anesthésique qui vous a été administré pour l'opération peut modifier l'efficacité des contraceptifs hormonaux.

Les médicaments contraceptifs hormonaux comprennent :

- Contraceptifs oraux (pilules anticonceptionnelles, y compris la pilule à progestatif seul)
- Contraceptifs injectables (injections contraceptives)
- Implants contraceptifs (petits bâtonnets en plastique insérés sous la peau ou dispositifs placés dans l'utérus [DIU ou stérilets])
- Timbres (petits timbres adhésifs à coller sur la peau)
- Anneaux vaginaux (anneaux souples en plastique à insérer dans le vagin)

Vous avez reçu l'anesthésique suivant :

- ☐ **sugammadex (Bridion®)** – Ce médicament vous aide à vous remettre plus rapidement de l'effet du relaxant musculaire utilisé pendant votre opération.

- › Il peut réduire l'efficacité de votre contraceptif hormonal pendant une période pouvant aller jusqu'à 7 jours (1 semaine).
- › **Utilisez une méthode contraceptive supplémentaire pendant au moins 7 jours après votre opération.**
- › Si vous prenez des pilules contraceptives, continuez à les prendre comme d'habitude tout en utilisant une méthode contraceptive supplémentaire.
- ☐ **aprépitant (Emend®)** – Ce médicament prévient les nausées (mal de cœur) après une opération.
 - › Il peut réduire l'efficacité de votre contraceptif hormonal pendant une période pouvant aller jusqu'à 28 jours (1 mois).
 - › **Utilisez une méthode contraceptive supplémentaire pendant au moins 28 jours après votre opération.**
 - › Si vous prenez des pilules contraceptives, continuez à les prendre comme d'habitude tout en utilisant une méthode contraceptive supplémentaire.
- ☐ **sugammadex (Bridion®) et aprépitant (Emend®)**
 - › **Si vous avez reçu du sugammadex (Bridion®) et de l'aprépitant (Emend®), utilisez une méthode contraceptive supplémentaire pendant au moins 28 jours après votre opération.**