

## 给门诊患者的输血后指示

您（或您的家人）做了输血，尽管罕见，但是您还是有可能发生反应。反应是罕见的，通常也会比较轻微，但是任何输血之后都可能会出现反应，即便您以前从未有过反应。您务必要观察并且告诉医护团队自己是否有以下症状：

- 皮疹、麻疹、发痒
- 觉得恶心或呕吐
- 咳嗽增多
- 头痛、头晕
- 对强光敏感
- 发烧/发冷
- 皮肤湿冷
- 感觉异常或极其疲倦
- 后背/胸部疼痛
- 呼吸困难、喘息
- 红色/褐色（血）尿
- 皮肤或眼白发黄

如果您在家感到不适，请致电 811 同注册护士谈。

**如果您有以下任何症状，请马上前往最近的急诊部：**

- 严重恶心和呕吐
- 严重后背、胸部或头部疼痛
- 呼吸困难
- 血尿

**不要自己开车。告诉工作人员您最近输过血。**

撰稿：新斯科舍省血液协调计划  
设计：新斯科舍省卫生局（NSHA）图书馆事务  
IWK 保健中心患者学习号码：PL-1031  
本指南中的信息仅作参考及教育用。  
这些信息并非保健或医疗建议。  
如果有任何疑问，请咨询您的医护人员。