

# Interaction des contraceptifs avec le sugammadex (Bridion®)

- Pendant votre opération le \_\_\_\_\_, vous avez reçu un médicament qui diminue l'efficacité de certaines méthodes de contraception hormonale. **Cela est important à savoir si vous prenez un contraceptif hormonal.**
- Le sugammadex (Bridion®) a été utilisé pour inverser les effets du relaxant musculaire qu'on vous a administré pendant votre opération. Il peut réduire l'efficacité des contraceptifs hormonaux pendant 7 jours (une semaine).
- Utilisez une méthode additionnelle de contraception pendant 7 jours après votre opération.
- Si vous prenez un contraceptif oral (« la pilule »), continuez à le prendre comme à l'habitude.

## Si vous utilisez :

- › un contraceptif oral (pilule anticonceptionnelle, incluant la pilule à base de progestérone seulement)
- › un contraceptif injectable (par injection)
- › un implant contraceptif (petit bâtonnet en plastique inséré sous la peau ou un stérilet)
- › un timbre contraceptif (petit timbre qu'on colle sur la peau)
- › un anneau vaginal (anneau en plastique souple inséré dans le vagin)

## Vous devez aussi utiliser, pendant 7 jours après votre opération, une méthode de contraception additionnelle, par exemple :

- › des condoms masculins
- › des condoms féminins
- › un diaphragme
- › une cape cervicale
- › une éponge contraceptive
- › l'abstinence (pas de rapports sexuels)