

# Programme scolaire de vaccination

## À quoi pouvez-vous vous attendre après que votre enfant a été vacciné contre :

- l'hépatite B
- le virus du papillome humain (VPH 9)
- le méningocoque (vaccin quadrivalent)
- le tétanos, la diphtérie et la coqueluche acellulaire

### EN CAS DE DOUTE, POSEZ DES QUESTIONS.

*Si vous avez la moindre question sur le contenu de ce livret, ou si vous ne comprenez pas quelque chose, communiquez avec le bureau de la santé publique de votre région. Vous trouverez les coordonnées des bureaux dans le livret du programme de vaccination des élèves.*

### QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES DES VACCINS?

De nombreux enfants ne ressentent aucun effet secondaire après la vaccination.

Les effets secondaires les plus courants sont une douleur, une rougeur ou une enflure à l'endroit où l'aiguille a pénétré dans la peau.

Il y a d'autres effets secondaires moins fréquents, comme un léger mal de tête, une fièvre, des frissons, la diarrhée, des nausées, des douleurs généralisées, la fatigue et des articulations endolories ou enflées.

### QUE DOIS-JE FAIRE SI MON ENFANT PRÉSENTE UNE RÉACTION OU A DE LA FIÈVRE?

Après la vaccination, votre enfant demeurera en observation pendant au moins 15 minutes, parce qu'il existe une faible possibilité qu'une réaction allergique plus grave se produise. Ce genre de réaction se produit généralement peu de temps après l'administration d'un vaccin, et l'infirmière qui surveille votre enfant pourra intervenir au besoin.

Si votre enfant fait de la fièvre après avoir reçu un vaccin, vous pouvez la traiter vous-même à la maison. Assurez-vous d'avoir de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène à la maison.

Une fièvre n'est pas forcément mauvaise, mais elle peut être gênante pour votre enfant. Si vous croyez que votre enfant a de la fièvre :

- Prenez sa température.
- Donnez-lui de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène si sa température dépasse 38,5 °C (101 °F), et suivez les directives sur l'étiquette du flacon.
- Encouragez-le à boire PLUS que d'habitude, comme du jus ou de l'eau.

### COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE FOURNISSEUR DE SOINS DE SANTÉ OU COMPOSEZ LE 811 SI :

- la fièvre dure plus de 24 heures;
- votre enfant a une température de 39,5 °C (103 °F) ou plus;
- la fièvre ne baisse pas après la prise d'acétaminophène ou d'ibuprofène;
- votre enfant semble malade et présente d'autres symptômes.

*Also available in English.*