

# البرنامج المدرسي للتحصين

## ما الذي يمكن أن تتوقعه بعد حصول طفلك على اللقاحات التالية:

لقاح التهاب الكبد ب

لقاح فيروس الورم الحليمي  
البشري (HPV 9)

اللقاح الرباعي ضد السحايا

لقاح التيتانوس، الدفتيريا  
والشاهوق غير الخلوي (Tdap)

إذا لم تكن متأكدًا، استفسر!

إذا كنت ترغب في طرح أي  
أسئلة حول اللقاح، أو إذا  
واجهتك صعوبة في فهم أي  
معلومات، يرجى الاتصال بمكتب  
الصحة العامة في منطقتك. تجد  
معلومات الاتصال في كتيب  
البرنامج المدرسي للتحصين.

هل سيعاني طفلي من أي آثار جانبية بعد حصوله على التطعيم؟

لا يعاني معظم الأطفال من أي آثار جانبية بعد حصولهم على التطعيم.

تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً الاحمرار، الورم، أو الألم في موضع وخز الابرة.

أما الآثار الجانبية الأقل شيوعاً فهي تتضمن صداع خفيف، ارتفاع بسيط في حرارة الجسم، ارتعاش، إسهال، غثيان، أو جوع في الجسم، قلة النشاط، ألم أو تورم في المفاصل.

ماذا الذي يمكنني فعله في حال عانى طفلي من الحساسية أو ارتفعت حرارته؟

بعد حصول طفلك على أي نوع من اللقاحات، سيخضع للمراقبة لمدة 15 دقيقة على الأقل، نظراً لوجود احتمال بسيط في تعرضه لردة فعل تحسسية حادة. تظهر عادة الحساسية الحادة بعد تلقيه اللقاح بفترة وجيزة.

تتولى الممرضة الإشراف على طفلك لتتمكن من الاعتناء به إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.

في حال ارتفعت حرارة طفلك، قد يتوجب عليك علاجه في المنزل بعد تلقيه اللقاح. تأكد من أنه لديك دواء الأستيامينوفين أو الأيبوبروفين في المنزل من باب الاحتياط.

لا يُعتبر ارتفاع حرارة الجسم من العلامات المقلقة بالضرورة، ولكنها قد تكون مزعجة للطفل. إذا شعرت بارتفاع حرارة طفلك، اتبع الخطوات التالية:

- قياس حرارة جسم الطفل.
- إعطاء الطفل الأستيامينوفين أو الأيبوبروفين في حال تجاوزت الحرارة 38.5 درجة مئوية (101 فهرنهايت)، مع اتباع التعليمات المدونة على العبوة.
- تشجيع الطفل على تناول كمية إضافية من السوائل كالماء والعصائر.

اتصل بمزود الرعاية الصحية أو على الرقم 811 في حال :

- استمرت الحرارة لأكثر من 24 ساعة
- بلغت أو تجاوزت الحرارة 39.5 درجة مئوية (103 درجة فهرنهايت)
- لم تنخفض الحرارة بعد إعطاء طفلك الأستيامينوفين أو الأيبوبروفين
- بدا طفلك مريضاً ويعاني من أعراض أخرى